

八千代医療センター採用医薬品集（外用・自己注射）

2025年2月～

※1【採用区分】

本採用：院内・院外で処方可能

院外採用（院外）：院外のみで処方可能

特別購入薬（特購）：患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録が必要です。患者登録を行う際は薬剤部までご連絡ください。

院内採用（院内）：院内のみ使用可能

院外・院内特別購入薬（院外・院内特購）：院外処方可能、院内は患者限定で処方可能。処方の際には患者登録を必要のため、薬剤部までご連絡ください。

院内特別購入薬（院内特購）：院内のみ患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録をするため、薬剤部までご連絡ください。

※2【処方可能区分（院内・院外）】

○：すべての患者に処方可能なもの

【般】：一般名マスタの処方が可能なもの

（限定）：処方可能な患者が限定されているもの

本採用：249品目 院外採用：316品目（特別購入薬：59目）

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院内	アイオピジンU D点眼液1%	10mg/mL 0.1mL/個	ア ^o ラカニジン塩酸塩	○	
院内	アイノフロー吸入用800ppm	800ppm/15.7L/本	一酸化窒素ガス		
本採用	アイファガン点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	アリモニジン酒石酸塩	○	○
院外	アイラミド配合懸濁性点眼液		プリモニジン・プリンゾラミド		○
本採用	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	50g/瓶	酸化亜鉛	○	○
院外	亜鉛華軟膏「ヨシダ」		酸化亜鉛		○
院外	アクアチムクリーム1%	10mg/g 10g/本	ナジフロキサシ		○
本採用	アクアチム軟膏1%	10mg/g 10g/本	ナジフロキサシ	○	○
本採用	アクトシン軟膏3%	30mg/g 30g/本	ブクレーシナトリウム	○	○
院外・院内特購	アジマイシン点眼液1%	1%1mL 2.5mL/本	アジスロマイシン水和物	(限定)	○
院外	アスタット軟膏1%	10mg/g 10g/本	ラノナール		○
院外	アズノールうがい液4%	40mg/mL 5mL/本	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物		○
本採用	アズノール軟膏0.033%	0.33mg/g 20g/本	ジメチルイソ ^o ピ ^o ルアズレン	○	○
本採用	アスプールの液(0.5%)	5mg/mL 50mL/本	dI-イソ ^o レナリン塩酸塩	○	○
院外	アズマネックスツイストヘラー200μg 60吸	200μg/吸入	エメタゾンフランカルボン酸エステル		○
院外	アズレン点眼液0.02%「わかもと」	0.2mg/mL 5mL/本	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物		○
本採用	アセトアミノフェン坐剤小児用100mg	100mg/個	アセトアミノフェン100mg坐剤	○	○
本採用	アセサイド6%消毒液OEM-2	第一剤:750mL 第二剤:750mL	過酢酸		
本採用	アセサイド6%消毒液OEM-3	第一剤:875mL 第二剤:875mL	過酢酸		
院外	アゾルガ配合懸濁性点眼液	5mL/本	アリゾラミド・フェロルマリン酸塩		○
院外	アテキュラ吸入用カプセル低用量	1カプセル中：インタ ^o カテロール酢酸塩173μg（インタ ^o カテロールとして150μg）・エメタゾンフランカルボン酸エステルカプセル	インタ ^o カテロール酢酸塩・エメタゾンフランカルボン酸エステルカプセル		○
院外	アテキュラ吸入用カプセル中用量	1カプセル中：インタ ^o カテロール酢酸塩173μg（インタ ^o カテロールとして150μg）・エメタゾンフランカルボン酸エステルカプセル	インタ ^o カテロール酢酸塩・エメタゾンフランカルボン酸エステルカプセル		○
院外	アテキュラ吸入用カプセル高用量	1カプセル中：インタ ^o カテロール酢酸塩173μg（インタ ^o カテロールとして150μg）・エメタゾンフランカルボン酸エステルカプセル	インタ ^o カテロール酢酸塩・エメタゾンフランカルボン酸エステルカプセル		○
院外	アドエア50エアゾール120吸入用	1噴霧中：サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾン ^o ピ ^o ン酸エステル36.3μg(サルメテロールとして25μg)/50μg	サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾン ^o ピ ^o ン酸エステル		○
院外・院内特購	アドエア125エアゾール120吸入用	1噴霧中：サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾン ^o ピ ^o ン酸エステル36.3μg(サルメテロールとして25μg)/125μg	サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾン ^o ピ ^o ン酸エステル	(限定)	○
院外	アドエア250エアゾール120吸入用	1噴霧中：サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾン ^o ピ ^o ン酸エステル36.3μg(サルメテロールとして25μg)/250μg	サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾン ^o ピ ^o ン酸エステル		○
本採用	アドエア100ディスクス28吸入用	1ディスク中：サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾン ^o ピ ^o ン酸エステル72.5μg(サルメテロールとして50μg)/100μg	サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾン ^o ピ ^o ン酸エステル	○	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	アドエア100ディスクス60吸入用	17リスター中:サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン [°] 0.1 [°] ホ酸エステル:72.5 μ g(サルメテロールとして50 μ g)/100 μ g	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン [°] 0.1 [°] ホ酸エステル		○
本採用	アドエア250ディスクス28吸入用	17リスター中:サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン [°] 0.1 [°] ホ酸エステル:72.5 μ g(サルメテロールとして50 μ g)/250 μ g	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン [°] 0.1 [°] ホ酸エステル	○	○
院外	アドエア250ディスクス60吸入用	17リスター中:サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン [°] 0.1 [°] ホ酸エステル:72.5 μ g(サルメテロールとして50 μ g)/250 μ g	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン [°] 0.1 [°] ホ酸エステル		○
院外	アドエア500ディスクス28吸入用	17リスター中:サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン [°] 0.1 [°] ホ酸エステル:72.5 μ g(サルメテロールとして50 μ g)/500 μ g	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン [°] 0.1 [°] ホ酸エステル		○
院外	アドエア500ディスクス60吸入用	17リスター中:サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン [°] 0.1 [°] ホ酸エステル:72.5 μ g(サルメテロールとして50 μ g)/500 μ g	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン [°] 0.1 [°] ホ酸エステル		○
院外	アドフィードパップ40mg	40mg/枚 7枚/包	フルビ [°] プロ [°] フェン		○
本採用	日点アトロピン点眼液1%	5mL/本	アトロ [°] ピ [°] ン硫酸塩水和物	○	○
院外	アトロベントエロゾル20 μ g	20 μ g/1噴霧	イ [°] プロ [°] ピ [°] ム臭化物水和物		○
院外	アニューイティ100 μ g エリプタ30吸入用	30吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル吸入剤		○
院外	アニューイティ200 μ g エリプタ30吸入用	30吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル吸入剤		○
院外	アノールエリプタ30吸入用	17リスター中:ウメクリジニウム62.5 μ g・ヒランテロール25 μ g	ウメクリジニウム臭化物・ヒランテロールトリフェル酢酸塩		○
院外	アピドラ注100単位/mL	1000単位/10mL/V	インスリン [°] グリ [°] ジン(遺伝子組換え)		○
特購	アピドラ注カート	1000単位/10mL/V	インスリン [°] グリ [°] ジン(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)
院外・院内特購	アピドラ注ソノスター	300単位/3mL/キット	インスリン [°] グリ [°] ジン(遺伝子組換え)	(限定)	○
院外	アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g	0.025mg	トリアムシノロンアセト [°] ド		○
本採用	アラセナー A 軟膏3%	30mg/g 5g/本	ヒ [°] タ [°] リ [°] ン	○	○
院外	アラミスト点鼻液27.5 μ g 56噴霧用	27.5 μ g/1噴霧	フルチカゾンフランカルボン酸エステル		○
院外	アラミスト点鼻液27.5 μ g 120噴霧用	27.5 μ g/1噴霧	フルチカゾンフランカルボン酸エステル		○
院外	アリケイス吸入液590mg	590mg/8.4mL/瓶	アミカシン硫酸塩		○
院外	アリドネパッチ27.5mg	27.5mg/枚	ト [°] ネ [°] ジ [°] ル		○
院外	アリドネパッチ55mg	55mg/枚	ト [°] ネ [°] ジ [°] ル		○
本採用	アルメタ軟膏	1mg/g 5g/本	アルクロメタゾ [°] ン [°] 0.1 [°] ホ酸エステル	○	○
院外	アレサガテープ4mg	4mg/枚 (2.23cm×3.61cm)	エメダスチンフマル酸塩貼付剤		○
院外	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	5mg/g	ヒ [°] ナ [°] ソ [°] ル [°] ン塩酸塩クリーム		○
院外	アレジオン点眼液0.05%	0.5mg/mL 5mL/本	ヒ [°] ナ [°] ソ [°] ル [°] ン塩酸塩		○
院外	アレジオンLX点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	ヒ [°] ナ [°] ソ [°] ル [°] ン塩酸塩		○
院外	アレバール吸入用溶解液0.125%	100mL/本	テ [°] ロ [°] ソ [°] ール(サ [°] リ [°] ン)		○
本採用	アンテベートクリーム0.05%	0.5mg/g 5g/本	ハ [°] タ [°] メ [°] タ [°] リ [°] ン酪酸エステル [°] 0.1 [°] ホ酸エステル	○	○
院外	アンテベートローション0.05%	0.5mg/g 10g/本	ハ [°] タ [°] メ [°] タ [°] リ [°] ン酪酸エステル [°] 0.1 [°] ホ酸エステル		○
本採用	アンテベート軟膏0.05%	0.5mg/g 5g/本	ハ [°] タ [°] メ [°] タ [°] リ [°] ン酪酸エステル [°] 0.1 [°] ホ酸エステル	○	○
院外	アンヒバ坐剤小児用50mg	50mg	アセトアミノ [°] フェン		○
院外	アンヒバ坐剤小児用100mg	100mg	アセトアミノ [°] フェン		○
院外	アンヒバ坐剤小児用200mg	200mg	アセトアミノ [°] フェン		○
本採用	アンベック坐剤10mg	10mg	ミ [°] ル [°] ビ [°] ネ塩酸塩水和物	○	○
院外	アンベック坐剤20mg	20mg	ミ [°] ル [°] ビ [°] ネ塩酸塩水和物		○
院外	イドメシニコワゲル1%	10mg/g 35g/本	インド [°] メ [°] タ [°] シ [°] ン		○
院外	イドメシニコワゾル1%	10mg/g 30g/本	インド [°] メ [°] タ [°] シ [°] ン		○
本採用	イナビル吸入粉末剤20mg	20mg/キット(水和物として20.76mg)	ラニミビル [°] ホ [°] ウ [°] 酸エステル	○	○
院外	イミグラン点鼻液20	20mg/0.1mL/本	スマトリ [°] フ [°] タ [°] ン		○

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	インスリン アスパルトBS注100単位/mL NR「サノフィ」	100単位/1mL 10mL/V	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液		○
院外	インスリン アスパルトBS注カート NR「サノフィ」	300単位/筒	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液		○
院外	インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」	300単位/キット	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液		○
特購	インスリン グルギンBS注カート「リリー」	300単位/筒	インスリン グルギン	(限定)	(限定)
本採用	インスリン グルギンBS注ミリオペン「リリー」	300単位/3mL/キット	インスリン グルギン	○	○
院外	インスリン リスプロBS注100単位/mL HU「サノフィ」	100単位/1mL、10mL/瓶	インスリン リスプロ		○
本採用	インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」	300単位/3mL/キット	インスリン リスプロ	○	○
院外	インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」	300単位/筒	インスリン リスプロ		○
本採用	インタール吸入液1%	20mg/2mL/A	カモグリク酸ナトリウム	○	○
院外	インテパンクリーム1%	1%/1g	インドメタシン		○
院外	インテパン坐剤25	25mg	インドメタシン		○
本採用	ウエルアップハンドローション1%(500mL)	1g/100mL 500mL/本	カルシウムグルコン酸塩		
院内	ウエルフォーム	180mL	クロルヘキシジングルコン酸塩		
院外	ウゴービ皮下注0.25mg SD	0.25mg/0.5mL/キット	セマグルチド(遺伝子組換え)		○
院外	ウゴービ皮下注0.5mg SD	0.5mg/0.5mL/キット	セマグルチド(遺伝子組換え)		○
院外	ウゴービ皮下注1.0mg SD	1mg/0.5mL/キット	セマグルチド(遺伝子組換え)		○
院外	ウゴービ皮下注1.7mg SD	1.7mg/0.75mL/キット	セマグルチド(遺伝子組換え)		○
院外	ウルティプロ吸入用カプセル	1Cp中:グリコピロニウム50μg・インダカテロール110μg	グリコピロニウム臭化物・インダカテロールレイン酸塩		○
院外	ウレパールクリーム10%	100mg/g 20g/本	尿素		○
本採用	ウレパールローション10%	100mg/g 20g/本	尿素	○	○
本採用	ウロマチックS 泌尿器科用灌流液3%	90g/3000mL/B	D-ソルビトール	○	○
本採用	エイゾプト懸濁性点眼液1%	10mg/mL 5mL/本	ブリンゾファミド	○	○
本採用	AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」	2g/包	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	○	【般】
院外	エイベリス点眼液0.002%	0.002%1mL 2.5mL/混合死菌浮遊液	オミデネバグ イソプロピル液		○
本採用	エキザルベ	0.166mL(大腸菌死菌:約1.5億個・ブドウ球菌死菌:約1.5億個・レンサ球菌死菌:約0.15億個・緑膿菌死菌:約0.15億個を含む)・ヒドロコルチゾン	混合死菌浮遊液・ヒドロコルチゾン	○	○
本採用	エクラープラスター20μg/cm2	7.5cm×10cm	デブドロニウムピロキサン酸エステル	○	○
院外	エクラ400μg ジェムエア60吸入用	400μg/回	アクリジニウム臭化物		○
特購	エコリシン眼軟膏	3.5g/本	エリスロマイシンアクトビオン酸塩・ポリスチレンメタンスルホン酸ナトリウム軟膏	(限定)	(限定)
本採用	エスケ坐剤「250」	250mg	抱水クオラー	○	○
院外	エスケ坐剤「500」	500mg	抱水クオラー		○
本採用	エスケ注腸用キット「500」	500mg/筒	抱水クオラー	○	○
院外	エストラーナテープ0.18mg	0.18mg/枚	エストラジール		○
院外	エストラーナテープ0.36mg	0.36mg/枚	エストラジール		○
院外	エストラーナテープ0.72mg	0.72mg/枚	エストラジール		○
本採用	S P トローチ0.25mg「明治」	0.25mg	テカリニウム塩化物	○	○
本採用	イタノール	500mL(15℃で95.1~96.9vol%を含む)	イタノール	○	○
院外	エナジア吸入用カプセル中用量	1カプセル中;インダカテロールレイン酸塩173μg(インダカテロールとして150μg)・グリコピロニウム臭化物63μg(グリコピロニウムとして50μg)・エタナジウムフランカルボン酸エステル80μg	インダカテロールレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物・エタナジウムフランカルボン酸エステル		○
院外	エナジア吸入用カプセル高用量	1カプセル中;インダカテロールレイン酸塩173μg(インダカテロールとして150μg)・グリコピロニウム臭化物63μg(グリコピロニウムとして50μg)・エタナジウムフランカルボン酸エステル80μg	インダカテロールレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物・エタナジウムフランカルボン酸エステル		○
院外	エヌジェン皮下注24mgペン	24mg/1.2mL/1キット	ソムアトロゴン(遺伝子組換え)		○

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	エヌジェン皮下注60mg/gペン	60mg/1.2mL/1キット	ソムアトロゴン(遺伝子組換)		○
院外	エピデュオゲル	15g/本	アパレン・過酸化ベンゾイルゲル		○
本採用	エネマスター注腸散	98.1g/100g 400g/本	硫酸バリウム	○	○
本採用	M S 温シブ「タイホウ」	5枚/包	サリチル酸メチル・dl-カンフル・トウガラシエキス	○	○
本採用	M S 冷シブ「タイホウ」	5枚/包	サリチル酸メチル・dl-カンフル・トメントール	○	○
本採用	エムラクリーム	リドカイン25mg・フピロカイン25mg/g 5g/本	リドカイン・フピロカイン	○	○
院外	エリザス点鼻粉末200μg 28噴霧用	200μg/噴霧 5.6mg/瓶	デキサメタゾン・ハロシ酸エステル		○
院外	エンクラッセ62.5μg エリプタ30吸入用	62.5μg	ウメクリジニウム臭化物		○
院外	エンペシドクリーム1%	10mg/g 10g/本	ケトアリザール		○
院外	オイラックスHクリーム	ケタミト100mg・ヒドロコルチゾン2.5mg/g 5g/本	ケタミト・ヒドロコルチゾン		○
本採用	オイラックスクリーム10%	100mg/g 10g/本	ケタミト	○	○
院外	オーキス9μg タービュヘイラ-60吸入	9μg/吸入	ホルモロルマル酸塩水和物		○
院外	オキサロールローション25μg/g	25μg/g 10g/本	マキサルチール		○
院外	オキサロール軟膏25μg/g	25μg/g 10g/本	マキサルチール		【般】
本採用	オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」	600mg/錠	オキシコナゾール硝酸塩錠	○	【般】
院内	オキシドール	100mL/本	オキシドール	○	
本採用	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	1.5mg/0.75mL/筒	アバロパラチド酢酸塩注射液	○	○
本採用	オスバン消毒液10%	500mL/本	ベンザルコニウム塩化物	○	○
本採用	オゼックス点眼液0.3%	0.3%/mL	トスフロキサシントシル酸塩水和物点眼液	○	○
本採用	オゼンピック皮下注2mg	2mg/本	セマケルト(遺伝子組み換え)キト	○	○
院内	オベガードM A 眼灌流液	ブドウ糖1.5mg・塩化ナトリウム6.6mg・塩化カリウム0.36mg・塩化カルシウム水和物0.18mg・硫酸マグネシウム水和物0.3mg・炭酸水素ナトリウム2.1mg/ml	ブドウ糖・塩化ナトリウム・塩化カリウム・塩化カルシウム水和物・硫酸マグネシウム水和物・炭酸水素ナトリウム		
院内	オベガン1.1眼粘弾剤1%	11mg/1.1mL/筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム		
院内	オベガンハイ0.85眼粘弾剤1%	8.5mg/0.85mL/筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム		
院外	オラドールトローチ0.5mg	0.5mg	トミフェン臭化物		○
院内	オラネジン消毒液1.5%	200mL/本	オキシジニウム臭化物		
院外	オラビ錠口腔用50mg	50mg/錠	ミコナゾール		○
本採用	オリブ油「ヨシダ」	25mL/本(滅菌済)	オリブ油	○	○
院外	オルセノン軟膏0.25%	2.5g/g 30g/本	トルチノールトコフェール		○
本採用	オルベスコ200μg インヘラ-56吸入用	200μg/1噴霧	シクレソニド	○	○
院外	オンプレス吸入用カプセル150μg	150μg	インダカテロールメレイン酸塩		○
院外	ガチフロ点眼液0.3%	5mL/本	ガチフロキサシン水和物		○
本採用	カデックス軟膏分包45mg	45mg/5g/包	ヨク素軟膏	○	○
院外	カミンローション*(丸石)	カミン8g・酸化亜鉛8g/100mL 500mL/本	カミン・酸化亜鉛		○
本採用	ピレノキシ懸濁性点眼液0.005%「参	0.05mg/mL 5mL/本	ピレノキシ	○	○
院外	キサラン点眼液0.005%	50μg/mL 2.5mL/本	タラノロスタ		○
本採用	キシロカインゼリー2%	20mg/mL 30mL/本	リドカイン塩酸塩	○	○
本採用	キシロカインビスカス2%	20mg/mL 100mL/瓶	リドカイン塩酸塩	○	○
本採用	キシロカインポンプスプレー8%	80mg/mL 80g/瓶	リドカイン	○	○
本採用	キシロカイン液「4%」	40mg/mL 100mL/瓶	リドカイン塩酸塩	○	○
本採用	キシロカイン点眼液4%	40mg/mL 20mL/瓶	リドカイン塩酸塩	○	○
本採用	キューバル100エアゾール	100μg/1噴霧	ベタメタゾン・ハロシ酸エステル	○	○
院外	強力ポステリザン(軟膏)	2g/本	大腸菌死菌浮遊液・ヒドロコルチゾン		○
本採用	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	10g/本	ヒドロコルチゾン酢酸エステル・フラジオマイシン硫酸塩・ジフェニトドラミン塩	○	○
本採用	キンダベート軟膏0.05%	0.5mg/g 5g/本	ケトアリザン酪酸エステル	○	○
院外	グラアルファ配合点眼液	5mL/本	リパズジル塩酸塩水和物・プリモニジン酒石酸塩		○
院外・院内特購	グラナテック点眼液0.4%	4mg/mL 5mL/本	リパズジル塩酸塩水和物	(限定)	○
院外	クワビット点眼液1.5%	15mg/mL 5mL/本	レボフロキサシン水和物		○
本採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50g/100g 30mL/個	グリセリン	○	○

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50g/100g 60mL/個	グリセリン	○	【般】
本採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50g/100g 120mL/個	グリセリン	○	○
本採用	グリセリン「ケンエー」	25mL/本 (84.0~87.0%を含む)	グリセリン	○	○
本採用	グリセリンBC液「ヨシダ」	250mL/瓶 (84.0~87.0%を含む)	0.025%ベンザルコニウム塩化物 添加グリセリン	○	○
本採用	クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%	10mg/g 10g/本	クリンダマイシンリン酸エステル	○	○
院外・ 院内特購	クレナフィン爪外用液10%	100mg/g 3.56g(4mL)/本	イフィコザール	(限定)	○
本採用	クロトリマゾールクリーム1%「イワキ」	10mg/g 10g/本	クロトリマゾール	○	【般】
院外	クロマイーP軟膏	クロラムフェニコール20mg・フラジ マイシン硫酸塩5mg・プレトニ ゾール3mg/g 25g/本	クロラムフェニコール・フラジ マイシン硫酸塩・プレトニ ゾール		○
院外	クロマイ膺錠100mg	100mg	クロラムフェニコール		○
本採用	クロラムフェニコール膺錠100mg「F」	100mg/錠	クロラムフェニコール	○	○
本採用	ゲーベンクリーム1%	10mg/g	スルファジアジン銀	○	○
本採用	ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」	2%1g 10g/本	ケトコナゾール2%クリーム	○	【般】
本採用	ケトチフェン点眼液0.05%「SW」	0.5mg/mL 5mL/本	ケトチフェン硫酸塩	○	【般】
本採用	ケトプロフェンテープ20mg「BMD」	7枚/包	ケトプロフェン	○	【般】
本採用	ケラチナミンコーワクリーム20%	200mg/g 25g/本	尿素	○	○
院外	ゲンタシン軟膏0.1%	1mg/g 10g/本	ゲンタマイシン硫酸塩		○
本採用	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	1mg/g 10g/本	ゲンタマイシン硫酸塩	○	【般】
院外・ 院内特購	コソプト配合点眼液	トルブアラミド10mg・フェドール 5mg/mL 5mL/本	トルブアラミド 塩酸塩・フェドール マリン酸塩	(限定)	○
院外	コソプトミニ配合点眼液	トルブアラミド10mg・フェドール 5mg/mL 0.4mL/本	トルブアラミド 塩酸塩・フェドール マリン酸塩		○
本採用	コレクチム軟膏0.25%	2.5mg/g 5g/本	デルコジコブ	○	○
院外	コレクチム軟膏0.5%	5mg/g 5g/本	デルコジコブ		○
院外	ザーネ軟膏0.5%	5mg(5000単位)/g 500g/瓶	ビタミンA油		○
本採用	サーファクテン気管注入用120mg	120mg/V	肺サーファクタント製剤	○	○
本採用	サイプレジン1%点眼液	10mg/mL 10mL/本	シクロピリトール塩酸塩	○	○
院外	ザジテン点眼液0.05%	0.5mg/mL 5mL/本	ケトチフェン硫酸塩		○
本採用	ザジテン点鼻液0.05%	0.5mg/mL 8mL/本	ケトチフェン硫酸塩	○	○
院内	サニサーウW	250mL/本	イタノール	○	
院内	サニサーウW	60mL/本	イタノール	○	
院外	サラゾピリン坐剤500mg	500mg/個	サラゾスルファピリジン		○
院外	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸100mg・白色ワセ リン900mg/g	サリチル酸ワセリン		○
院外	サリベートエアゾール	50g/個	リン酸二カリウム・無機塩類配 合剤噴霧剤		○
院外	サルコートカプセル外用50μg	50μg/カプセル	ベンザルコニウムリン酸エステル		○
本採用	サルタノールインヘラー100μg	100μg/1回噴霧	サルタノール硫酸塩	○	○
院外	サンコバ点眼液0.02%	0.2mg/mL 5mL/本	シアノコバラミン		○
院外	サンピロ点眼液1%	10mg/mL 5mL/本	ピロピロリン酸塩		○
本採用	サンピロ点眼液2%	20mg/mL 5mL/本	ピロピロリン酸塩	○	○
院外	サンピロ点眼液3%	30mg/mL 5mL/本	ピロピロリン酸塩		○
本採用	サンバクザン眼耳鼻科用液0.1%	5mg/5mL/本	ベンザルコニウムリン酸エステルナトリウム	○	○
本採用	産婦人科用イソジンクリーム5%	250g/本	ホルモニド	○	○
本採用	シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」	5mL/本	シアノコバラミン液	○	○
院外	シープリ吸入用カプセル50μg	50μg/Cp 7Cp/シート	グリコピロニウム臭化物		○
本採用	シエルガン0.5眼粘弾剤	0.5mL/1筒	ヒアルロン酸ナトリウム・ コンドロイチン硫酸エステルナトリウム液	○	○
院外	ジクアス点眼液3%	30mg/mL 5mL/本	ジクアホルナトリウム		○
院外	ジクアスLX点眼液3%	30mg/mL 5mL/本	ジクアホルナトリウム		○
本採用	ジクトルテープ75mg	75mg1枚	ジクロフェナクナトリウム	○	○
院外	ジクロード点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	ジクロフェナクナトリウム		○
本採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日 医工」	12.5mg	ジクロフェナクナトリウム	○	○
本採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医	25mg	ジクロフェナクナトリウム	○	○
本採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医	50mg	ジクロフェナクナトリウム	○	○
特購	ジムソ膀胱内注入液50%	50%50mL1瓶	ジメチルホルムジアン液	(限定)	(限定)
本採用	シムビコートタービュヘイラー60吸入	ブデソニド160μg・ホルモニド ル硫酸塩水和物4.5μg/	ブデソニド・ホルモニド硫酸塩 水和物	○	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	消毒用エタノール「ケンエー」	500mL/本	エタノール	○	○
院外	小児用レルベア50エリプタ30吸入用	17 ^μ リスター中:ビ ^μ ランテロール25 ^μ g・フルチカゾンフランカルボン酸エステル50 ^μ g	ビ ^μ ランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル吸入剤		○
院外	ジルダザック軟膏3%	30mg/g 10g/本	ベンゾカドバトール		○
院外	人工涙液マイティア点眼液	5mL/瓶	ホウ酸・無機塩類配合剤液		○
本採用	ジンジカインゲル20%	30g/本	アミノ安息香酸エチル液	○	○
院外	親水クリーム「ホエイ」	-	親水クリーム		○
本採用	シンボニー皮下注50mg オートインジェク	50mg/0.5mL/キット	ゴリムマブ [®] (遺伝子組換え)	○	
本採用	新レシカルボン坐剤	1個	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム	○	○
本採用	スープレイン吸入麻酔液	1mL/mL 240mL/瓶	デスフルタン	○	○
本採用	スコピゾル眼科用液	ヒド ^μ ロキシフェリル ^μ ス15mg・塩化ナトリウム5.5mg・塩化カリウム1.6mg・乾燥炭酸ナトリウム0.6mg・リン酸水素ナトリウム水和物1.8mg・リン酸12mg 15mL/本	ヒド ^μ ロキシフェリル ^μ ス・塩化ナトリウム・塩化カリウム・乾燥炭酸ナトリウム・リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸	○	○
院外	スタデルムクリーム5%	50mg/g 10g/本	イ ^μ プロ ^μ フェニ ^μ コノール		○
本採用	スタデルム軟膏5%	50mg/g 10g/本	イ ^μ プロ ^μ フェニ ^μ コノール	○	○
本採用	ステリックロンRエタノール液0.5	0.5g/100mL 500mL/	カルハキシジ ^μ ン ^μ ク ^μ ル ^μ ン ^μ 酸 ^μ 塩 ^μ ・エタノール	○	○
院外	ステリックロンW液0.02	0.02g/100mL 500mL/	カルハキシジ ^μ ン ^μ ク ^μ ル ^μ ン ^μ 酸 ^μ 塩 ^μ		○
本採用	ステリックロンW液0.5	0.5g/100mL 500mL/	カルハキシジ ^μ ン ^μ ク ^μ ル ^μ ン ^μ 酸 ^μ 塩 ^μ	○	○
院外	ステロネマ注腸3mg	3mg(リン酸エステルナトリウムとして3.95mg) 100mL/個	ベ ^μ タメタゾ ^μ ン ^μ リン ^μ 酸 ^μ エ ^μ ステ ^μ ル ^μ ナ ^μ トリ ^μ ウム		○
本採用	スピオルトレスピマツト60吸入	1 ^μ 噴霧中 ^μ フル ^μ ピ ^μ ロ ^μ ム ^μ 2.5 ^μ g 及び ^μ フル ^μ ピ ^μ ロ ^μ ム ^μ 2.5 ^μ g	フル ^μ ピ ^μ ロ ^μ ム ^μ 臭 ^μ 化 ^μ 物 ^μ 水 ^μ 和 ^μ 物 ^μ ・ ^μ フル ^μ ピ ^μ ロ ^μ ム ^μ 塩 ^μ 酸 ^μ 塩 ^μ	○	○
院外	スピール膏M	357g/m ² 25cm ² /枚	サリチル酸		○
院外・院内特購	スピラゾン軟膏0.3%	3mg/g 5g/本	プレ ^μ ト ^μ ニ ^μ コ ^μ ビ ^μ ロン ^μ 吉 ^μ 草 ^μ 酸 ^μ エ ^μ ステ ^μ ル ^μ 酢 ^μ 酸 ^μ エ ^μ ステ ^μ ル	(限定)	○
本採用	スピリーバ2.5 ^μ g レスピマツト60吸入	2.5 ^μ g/ ^μ 噴霧	フル ^μ ピ ^μ ロ ^μ ム ^μ 臭 ^μ 化 ^μ 物 ^μ 水 ^μ 和 ^μ 物 ^μ	○	○
院外・院内特購	スピリーバ吸入用カプセル18 ^μ g	18 ^μ g/Cp 7Cp/シート	フル ^μ ピ ^μ ロ ^μ ム ^μ 臭 ^μ 化 ^μ 物 ^μ 水 ^μ 和 ^μ 物 ^μ	(限定)	○
院外	スプレキア点鼻液0.15%	15mg(酢酸塩として15.75mg)/10mL/本	ブ ^μ セ ^μ レ ^μ リン ^μ 酢 ^μ 酸 ^μ 塩 ^μ		○
院外・院内特購	スミスリンローション5%	50mg/g 30g/本	フェ ^μ トリ ^μ ン	(限定)	○
院外	ゼビアクスローション2%	10g/本	セ ^μ ビ ^μ ノ ^μ キ ^μ シン		○
本採用	ゼフナートクリーム2%	20mg/g 10g/本	リ ^μ ナ ^μ フ ^μ ア ^μ ト	○	○
院外	ゼフナート外用液2%	20mg/mL 10mL/本	リ ^μ ナ ^μ フ ^μ ア ^μ ト		○
本採用	セボフルラン吸入麻酔液「VTRS」	250mg/250mL/B	セ ^μ ボ ^μ フル ^μ ラン	○	○
院外	セルタッチパップ70	70mg/枚 7枚/包	フェ ^μ ル ^μ ビ ^μ タ ^μ ク		○
院外	セルタッチパップ140	140mg/枚 7枚/包	フェ ^μ ル ^μ ビ ^μ タ ^μ ク		○
院外	セレベント50ディスクス	50 ^μ g/17 ^μ リスター- 60 ^μ リスター/個	サル ^μ メ ^μ テ ^μ ロ ^μ ル ^μ キ ^μ チ ^μ ナ ^μ 酸 ^μ 塩 ^μ		○
本採用	ゾピラックス眼軟膏3%	30mg/g 5g/本	ア ^μ シ ^μ ク ^μ ビ ^μ ル	○	○
院外	ゾピラックス軟膏5%	50mg/g 5g/本	ア ^μ シ ^μ ク ^μ ビ ^μ ル		○
本採用	ソフラチュール貼付剤10cm	10cm×10cm 10.8mg/枚	フ ^μ ラ ^μ ジ ^μ オ ^μ マイ ^μ シン ^μ 硫 ^μ 酸 ^μ 塩 ^μ	○	○
院外	ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」シユアパル	5mg/筒	ソ ^μ マ ^μ ト ^μ ロ ^μ ピ ^μ ン ^μ (遺伝子組換え)		○
院外	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シユアパル	10mg/筒	ソ ^μ マ ^μ ト ^μ ロ ^μ ピ ^μ ン ^μ (遺伝子組換え)		○
院外・院内特購	ソリクア配合注ソロスター	1キット	イン ^μ ス ^μ リン ^μ グ ^μ ラ ^μ ル ^μ ギ ^μ ン ^μ (遺伝子組換え)・リ ^μ キ ^μ シ ^μ セ ^μ ナ ^μ チ ^μ ド ^μ 配 ^μ 合 ^μ 剤 ^μ キ ^μ ット	(限定)	○
本採用	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	1キット	イン ^μ ス ^μ リン ^μ デ ^μ グ ^μ ル ^μ デ ^μ ク ^μ (遺伝子組換え)・リ ^μ ラ ^μ グ ^μ ル ^μ チ ^μ ド ^μ (遺伝子組換え)配 ^μ 合 ^μ 剤 ^μ キ ^μ ット	○	○
本採用	ソルバース	500g/瓶	マ ^μ ク ^μ ロ ^μ ゴ ^μ ール ^μ 400 マ ^μ ク ^μ ロ ^μ ゴ ^μ ール ^μ 4000	○	○
本採用	ダイアブ坐剤4	4mg	ジ ^μ ア ^μ セ ^μ バ ^μ ム	○	○
本採用	ダイアブ坐剤6	6mg	ジ ^μ ア ^μ セ ^μ バ ^μ ム	○	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	ダイアップ坐剤10	10mg	ジアセパム	○	○
院内	タコシール組織接着用シート	ヒトフィブリゲン5.5mg・トロンビン画分2.0IU・ウマコラーゲン2.1mg/1cm ² [4.8cm×4.8cm/枚 (ハーフサイズ)]	生体組織接着剤		
院内	タコシール組織接着用シート	ヒトフィブリゲン5.5mg・トロンビン画分2.0IU・ウマコラーゲン2.1mg/1cm ² [9.5cm×4.8cm/枚 (レギュラーサイズ)]	生体組織接着剤		
院外	タブコム配合点眼液	2.5mL/本	タフルプロスト・チロルマリン酸		○
院外	タブロス点眼液0.0015%	15μg/mL 2.5mL/本	タフルプロスト		○
院外	タブロスミニ点眼液0.0015%	0.3mL/本	タフルプロスト		○
本採用	タリビッド眼軟膏0.3%	3mg/g 3.5g/本	タロキサシン	○	○
本採用	タリビッド耳科用液0.3%	3mg/mL 5mL/本	タロキサシン	○	○
院外	タリムス点眼液0.1%	0.1%5mL/本	タロリムス水和物		○
本採用	チモプトルX E点眼液0.5%	2.5mL/A	チロルマリン酸塩	○	○
院外	ツムラ紫雲膏	500g×1瓶	紫雲膏		○
本採用	ツロブテロールテープ0.5mg「久光」	0.5mg/枚	ツロブテロール	○	【般】
本採用	ツロブテロールテープ1mg「久光」	1mg/枚	ツロブテロール	○	【般】
本採用	ツロブテロールテープ2mg「久光」	2mg/枚	ツロブテロール	○	【般】
院内	ティスオーパ消毒液0.55%	3.8L/本	フタル		
院外	ティビゲル1mg	1mg	イストラジオール		○
院外・ 院内特購	ディフェリングル0.1%	15g/本	アダパレン	(限定)	○
本採用	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	5g/本	デキサメタゾン	○	【般】
本採用	デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリ	2.5μg/1回噴霧	デスモプレシン酢酸塩水和物	○	○
院外	デタントール0.01%点眼液	5mL/本	ブナリジン塩酸塩		○
本採用	テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏	0.6g/本	エピジヒドロコlestリン・テトラサイクリン塩酸塩軟膏	○	○
院外	デュアック配合ゲル	クワクマイシンリン酸エステル水和物10mg・過酸化ベンゾイル30mg/g 10g/本	クワクマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル		○
院外	デュオトラバ配合点眼液	トラホプロスト40μg・チロルマリン酸塩5mg	トラホプロスト・チロルマリン酸塩		○
院外	デュロテップM Tパッチ2.1mg	2.1mg/枚	フェンタニル		○
院外	デュロテップM Tパッチ4.2mg	4.2mg/枚	フェンタニル		○
院外	デュロテップM Tパッチ8.4mg	8.4mg/枚	フェンタニル		○
院外	デュロテップM Tパッチ16.8mg	16.8mg/枚	フェンタニル		○
本採用	テラマイシン軟膏 (ポリミキシンB含有)	25g/本	テラジトサイクリン塩酸塩・ポリミキシンB硫酸塩	○	○
院外	デルマクリンA軟膏1%	10mg/g 10g/本	グリチルリチン酸		○
本採用	デルモゾールgローション	10mL/本	ヘタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタイン硫酸塩	○	○
院外	デルモベートクリーム0.05%	-	クハタリールプロピオン酸エステル		○
院外・ 院内特購	デルモベートスカルプローション0.05%	0.5mg/g 10g/本	クハタリールプロピオン酸エステル	(限定)	○
本採用	デルモベート軟膏0.05%	5g/本	クハタリールプロピオン酸エステル	○	○
本採用	テリルジー100エリプタ14吸入用	14吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸	○	○
院外	テリルジー100エリプタ30吸入用	30吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸		○
本採用	テリルジー200エリプタ14吸入用	14吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸		○
院外	テリルジー200エリプタ30吸入用	30吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸		○
院外・ 院内特購	テレミンソフト坐薬2mg	2mg	ヒソジブル	(限定)	○
本採用	テレミンソフト坐薬10mg	10mg	ヒソジブル	○	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
特購	トービ吸入液300mg	300mg/5mL/管	トブマイシン	(限定)	(限定)
院外	トブシムクリーム0.05%	10g/本	フルオノト		○
本採用	トブシムローション0.05%	10g/本	フルオノト	○	○
院外	トブシム軟膏0.05%	10g/本	フルオノト		○
院外・ 院内特購	トブラシン点眼液0.3%	5mL/本	トブマイシン	(限定)	○
院外	ドボネックス軟膏50μg/g	10g/本	カルシトリアル		○
院外	ドボベツゲル	15g/本	カルシボトリオール水和物・ベタ メタゾンジプロピオン酸エステル		○
院外	ドボベツ軟膏	カルシトリアル50.0μg・ベタ メタゾンジプロピオン酸エステル 0.643mg/g 15g/本	カルシトリアル水和物・ベタメタ ゾンジプロピオン酸エステル		○
院外	ドボベツ軟膏	カルシトリアル50.0μg・ベタ メタゾンジプロピオン酸エステル 0.643mg/g 30g/本	カルシトリアル水和物・ベタメタ ゾンジプロピオン酸エステル		○
院外	ドボベツフォーム	60g/本	カルシボトリオール水和物・ベタ メタゾンジプロピオン酸エステル		○
院外	トラバタンズ点眼液0.004%	2.5mL/本	トラホプロスト		○
院外	トルソプト点眼液1%	5mL/本	トルトラミド塩酸塩		○
本採用	トルリシテ皮下注0.75mg アテオス	0.75mg/0.5mL/キット	デュラゲルド	○	○
本採用	トレシーバ注 フレックスタッチ	300単位/筒	イヌリン デカゲルテク (遺伝子組 換え)	○	○
特購	トレシーバ注 ペンフィル	300単位/筒	イヌリン デカゲルテク (遺伝子組 換え)	(限定)	(限定)
本採用	トロンピン液モチダ ソフトボトル1万	10000単位	トロンピン	○	○
本採用	ナウゼリン坐剤10	10mg	ドンパリドン	○	○
本採用	ナウゼリン坐剤30	30mg	ドンパリドン	○	○
本採用	ナウゼリン坐剤60	60mg	ドンパリドン	○	○
院外	ナゾネックス点鼻液50μg 112噴霧用	50μg/噴霧	メタゾンフランカルボン酸エステル水和		○
本採用	ナノバスニードルⅡ	34G×4mm	-	○	○
院外	ナバゲルンローション3%	50mL/本	フェルビナク		○
院外	ナバゲルン軟膏3%	25g/本	フェルビナク		○
院外	ニコチネルTTS10	(17.5mg)10cm2 /枚	ニコチン		○
院外	ニコチネルTTS20	(35mg)20cm2 /枚	ニコチン		○
院外	ニコチネルTTS30	(52.5mg)30cm2 /枚	ニコチン		○
院外	ニゾールクリーム2%	10g/本	ケトナゾール		○
院外	ニゾールローション2%	10g/本	ケトナゾール		○
院外	ニトログリセリンテープ27mg「トーフ」	27mg/9.6cm2/枚	ニトログリセリン貼付剤		○
本採用	ニトロダームTTS25mg	25mg/枚	ニトログリセリン	○	○
院外	ニプラジロール点眼液0.25%「わかもと」	5mL/本	ニプラジロール		○
院外	ニュープロパッチ2.25mg	2.25mg/枚	ロキソニン		○
院外・ 院内特購	ニュープロパッチ4.5mg	4.5mg/枚	ロキソニン	(限定)	○
本採用	ニュープロパッチ9mg	9mg/枚	ロキソニン	○	○
院外・ 院内特購	ニュープロパッチ13.5mg	13.5mg/枚	ロキソニン	(限定)	○
院外・ 院内特購	ニュープロパッチ18mg	18mg/枚	ロキソニン	(限定)	○
院外	ネオキシテープ73.5mg	73.5mg/枚	ナジフロキシリン塩酸塩		○
本採用	ネオシネジンコーワ5%点眼液	10mL/本	フェニレリン塩酸塩	○	○
本採用	ネオステリングリーンうがい液0.2%	340mL/瓶	ベンゼトニウム塩化物液	○	○
本採用	ネオメドロールE E軟膏	3g/本	フラジマイシン硫酸塩・メフルロト コゾロン	○	○
本採用	ネキソブリッド外用ゲル5g	5g/瓶(混合用ゲル付)	ハ イアップル茎搾汁精製物	○	○
本採用	ネグミンシュガー軟膏	100g/瓶	精製白糖 ホピトノヨド	○	○
本採用	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	ホピトノヨド	○	○
院外・ 院内特購	ノボラビッド30ミックス注 フレックスペン	300単位/3mL	イヌリン	(限定)	○
院外	ノボラビッド30ミックス注 ペンフィル	300単位/3mL	イヌリン		○
院外	ノボラビッド50ミックス注 フレックスペン	300単位/本	イヌリン アスパルト		○
本採用	ノボラビッド注 フレックスタッチ	300単位/3mL	イヌリン アスパルト	○	○
院外・ 院内特購	ノボラビッド注 フレックスペン	300単位/3mL	イヌリン アスパルト	(限定)	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・ 院内特購	ノボラピッド注 ペンフィル	300単位/3mL	インスリン アスパルト	(限定)	○
本採用	ノボラピッド注 100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン アスパルト	○	○
院外・ 院内特購	ノボリン30 R 注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	(限定)	○
本採用	ノボリンN注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	○	○
院外・ 院内特購	ノボリンR注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	(限定)	○
院外・ 院内特購	ノボリンR注 100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン	(限定)	○
院外・ 院内特購	ノルスパンテープ10mg	10mg/枚	ブプレリウム	(限定)	○
院外	ノルスパンテープ20mg	20mg/枚	ブプレリウム		○
院外	ノルスパンテープ5mg	5mg/枚	ブプレリウム		○
本採用	ハイジール消毒用液10%	10%/10mL	アルキルジアミノエチルグリシン 塩酸塩	○	○
院外	ハイバジールコーワ点眼液0.25%	5mL/本	コブラジロール		○
本採用	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」	2% 500mL	チオ硫酸ナトリウム・イタノール	○	○
院外	白色ワセリン	100g/本	白色ワセリン		○
院外	バクスマー一点鼻粉末剤3mg	3mg/瓶	ゲルコゴン		○
本採用	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	3g/本	塩化ロシカルシウム	○	○
院外	パタノール点眼液0.1%	5mL/本	ホパタジウム塩酸塩		○
院外	含嗽用ハチアズレ顆粒	2g/包	アズレスリン酸ナトリウム水和物・ 炭酸水素ナトリウム		○
院内	ハッカ油「コザカイ・M」	20mL/本	ハッカ油	○	
院外	パピロックミニ点眼液0.1%	0.4mL/本	シクロスポリン		○
院外・ 院内特購	パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入	200μg/1回噴霧	ブデソニド	(限定)	○
本採用	パルミコート吸入液0.25mg	0.25mg/2mL/A	ブデソニド	○	○
院外・ 院内特購	パルミコート吸入液0.5mg	0.5mg/A	ブデソニド	(限定)	○
院外	ハルロピテープ8mg	8mg/枚	ロピニロール塩酸塩		○
院外	ハルロピテープ16mg	16mg/枚	ロピニロール塩酸塩		○
院外	ハルロピテープ24mg	24mg/枚	ロピニロール塩酸塩		○
院外	ハルロピテープ32mg	32mg/枚	ロピニロール塩酸塩		○
特購	バンコマイシン眼軟膏1%	5g/本	バンコマイシン	(限定)	(限定)
院外	パンドルクリーム0.1%	5g/本	酪酸プロピオン酸トコシルゲン		○
本採用	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	5mL/本	ヒアルロン酸ナトリウム	○	【般】
院内	ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「アルコン」	0.6mL/筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム液		
院外	ヒアレイン点眼液0.1%	5mL/本	ヒアルロン酸ナトリウム		○
院外	ヒアレイン点眼液0.3%	3mg/mL 5mL/本	精製ヒアルロン酸ナトリウム		○
本採用	ヒアレインミニ点眼液0.3%	0.4mL/本	ヒアルロン酸ナトリウム	○	○
本採用	PA・ヨード点眼・洗眼液	0.2%/1mL	ポリビニルアルコールヨウ素液	○	○
本採用	ビーエスエスプラス500眼灌流液	20mL/B (希釈液付)	チンクワ	○	○
院内	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	0.6mL/本	ヒアルロン酸ナトリウム		
院内	ビオシラビング消毒液0.2W/V%	300mL/本	ベンザルコニウム塩化物		
院外・ 院内特購	ビクトーザ皮下注18mg	18.0mg/筒	リラグルチド	(限定)	○
本採用	ビソノテープ4mg	4mg/枚	ビソプロロール	○	○
院内	ビスクラブ消毒液4%	4% 500mL	グルキジジグロン酸塩		○
本採用	5%ビビテン液	500mL/本	グルキジジグロン酸塩	○	○
院外	ビベスピエアロスフィア28吸入	28吸入/キット	グリコピロニウム臭化物・ホルモ テロールフル酸塩水和物吸		○
院外	ピマリシン点眼液5%「センジュ」	5mL/本	ピマリシン		○
院外	ヒューマリン3/7注カート	300単位/3mL	インスリン		○
院外	ヒューマリン3/7注ミリオベン	300単位/3mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)		○
本採用	ヒューマリンN注100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン	○	○
院外	ヒューマリンN注カート	300単位/3mL	インスリン		○
院外	ヒューマリンN注ミリオベン	300単位/3mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)		○
本採用	ヒューマリンR注ミリオベン	300単位/3mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	○	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	ヒューマリンR注カート	300単位/3mL	インスリン		○
本採用	ヒューマリンR注100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン	○	○
院外	ヒューマログミックス25注ミリオペン	300単位/キット	インスリンアスパ [®] 0混合製剤-25		○
院外	ヒューマログミックス50注ミリオペン	300単位/キット	インスリンアスパ [®] 0混合製剤-50		○
院外	ヒューマログ注カート	300単位/筒	インスリンアスパ [®] 0(遺伝子組み換え)		○
院外・ 院内特購	ヒューマログ注100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン	(限定)	○
院外・ 院内特購	ヒューマログ注ミリオペン	300単位/3mL	インスリンアスパ [®] 0(遺伝子組み換え)	(限定)	○
院外	ヒューマログ注ミリオペンHD	300単位/キット	インスリンアスパ [®] 0(遺伝子組み換え)		○
院外	ヒルドイドクリーム0.3%	25g/本	ハ [®] リン類似物質		○
院外	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	25g/本	ハ [®] リン類似物質		○
院外	ヒルドイドローション0.3%	25g/本	ハ [®] リン類似物質		○
院外	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	56吸入/キット	ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフル酸塩水和物吸入剤		○
院外	5-FU軟膏5%協和	5g/本	フルオウラシル		○
院外・ 院内特購	フィアスブ注 100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン アスパ [®] ルト(遺伝子組み換え)	(限定)	○
院外・ 院内特購	フィアスブ注 フレックスタッチ	300単位/キット	インスリン アスパ [®] ルト(遺伝子組み換え)	(限定)	○
院外	フィアスブ注 ペンフィル	300単位/本	インスリン アスパ [®] ルト(遺伝子組み換え)		○
本採用	フィブラストスプレー500	1個	トラフェルミン(遺伝子組換え)	○	○
本採用	フェノール・亜鉛華リニメント「ホエイ」	500g/瓶	フェノール 亜鉛華リニメント	○	○
院外	フェルピナクパップ70mg「ユートク」	70mg/枚 7枚/包	フェルピナク		○
本採用	フェントステープ0.5mg	0.5mg/枚	フェンタニル塩酸塩	○	○
本採用	フェントステープ1mg	1mg/枚	フェンタニル塩酸塩	○	○
本採用	フェントステープ2mg	2mg/枚	フェンタニル塩酸塩	○	○
本採用	フェントステープ4mg	4mg/枚	フェンタニル塩酸塩	○	○
院外	フェントステープ6mg	6mg/枚	フェンタニル塩酸塩		○
院外	フェントステープ8mg	8mg/枚	フェンタニル塩酸塩		○
本採用	複方ヨード・グリセリン* (小堺)	500mL/本	複方ヨード・グリセリン	○	○
本採用	フラジール錠250mg	250mg	メロニダゾール	○	○
本採用	プラスチバックU100	30G×1cc	-	○	○
本採用	フランドルテープ40mg	40mg	硝酸イソリビド [®]	○	○
本採用	プリベシー液0.02%	500mL/本	ベンザルコニウム塩化物	○	○
本採用	プリベシー液0.05%	500mL/本	ベンザルコニウム塩化物	○	○
院外	プリベナ液0.05%	500mL/本	ナファリン硝酸塩		○
院外	フルタイド50μgエアゾール120吸入用	50μg/1回噴霧	フルチカゾン [®] 0 [®] 0 [®] オ [®] ン酸エステル		○
院外	フルタイド100μgエアゾール60吸入用	100μg/1回噴霧	フルチカゾン [®] 0 [®] 0 [®] オ [®] ン酸エステル		○
本採用	フルタイド100デイスカス	100μg/1回噴霧	フルチカゾン [®] 0 [®] 0 [®] オ [®] ン酸エステル	○	○
院外	フルタイド200デイスカス	200μg/1回噴霧	フルチカゾン [®] 0 [®] 0 [®] オ [®] ン酸エステル		○
本採用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 27.5μg「武田テバ」56噴霧用	27.5μg/1噴霧	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	○	【般】
院外	フルティフォーム50エアゾール56吸入用	1噴霧中:フルチカゾン [®] 0 [®] 0 [®] オ [®] ン酸エステル50μg・ホルモテロールフル酸塩水和物5μg	フルチカゾン [®] 0 [®] 0 [®] オ [®] ン酸エステル・ホルモテロールフル酸塩水和物		○
院外	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	1噴霧中:フルチカゾン [®] 0 [®] 0 [®] オ [®] ン酸エステル125μg・ホルモテロールフル酸塩水和物5μg	フルチカゾン [®] 0 [®] 0 [®] オ [®] ン酸エステル・ホルモテロールフル酸塩水和物		○
本採用	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	1噴霧中:フルチカゾン [®] 0 [®] 0 [®] オ [®] ン酸エステル125μg・ホルモテロールフル酸塩水和物5μg	フルチカゾン [®] 0 [®] 0 [®] オ [®] ン酸エステル・ホルモテロールフル酸塩水和物	○	○
院外	フルメタクリーム	5g/本	メタゾンフランカルボン酸エステル		○
院外・ 院内特購	フルメタ軟膏	5g/本	メタゾンフランカルボン酸エステル	(限定)	○
本採用	フルメトン点眼液0.02%	5mL/本	フルメトン	○	○
本採用	フルメトン点眼液0.1%	5mL/本	フルメトン	○	○
院内	プレグランディン腔坐剤1mg	1mg	ゲメ [®] 0 [®] スト	○	
院外・ 院内特購	プレドニン眼軟膏	5g/本	プレドニゾロン酢酸エステル	(限定)	○
特購	プレドネマ注腸20mg	20mg/個	プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム注腸剤	(限定)	(限定)

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	-	フルホセインナトリウム	○	○
本採用	プロクトセディル軟膏	2g/本	外用痔疾患用薬	○	○
院外	フロジン外用液5%	30mL/本	カル [®] ロウム塩化物水和物		○
本採用	プロスタンディン軟膏0.003%	10g/本	アル [®] ロスタジル アルファデクス	○	○
院外	プロトピック軟膏0.03%小児用	5g/本	タクロイム水和物		○
院外・ 院内特購	プロトピック軟膏0.1%	5g/本	タクロイム水和物	(限定)	○
本採用	プロナック点眼液0.1%	5mL/本	ブ [®] ムフェナクナトリウム水和物	○	○
本採用	プロベト	100g/本	白色ワセリン	○	○
本採用	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイ	2mg/mL 45mL/本	ブ [®] ロムヘキシン塩酸塩	○	○
院外	ブロメライン軟膏5万単位/g*(ジエイド ルフ)	20g/本	ブロメライン		○
院外・ 院内特購	ベガモックス点眼液0.5%	5mL/本	モキシロキサシン塩酸塩	(限定)	○
本採用	ベストロン耳鼻科用1%	5mL/本	セフメキシム塩酸塩	○	○
本採用	ベストロン点眼用0.5%	5mL/本	セフメキシム塩酸塩	○	○
院外・ 院内特購	ベセルナクリーム5%	12.5mg/包	イミモト [®]	(限定)	○
本採用	ベネトリン吸入液0.5%	5mg/mL	サル [®] ブ [®] タール硫酸塩	○	○
本採用	ベノキシル点眼液0.4%	5mL/本	ホキシ [®] ブ [®] ロイン塩酸塩	○	○
院外	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3% 「PP」	100g/本	ヘパリン類似物質噴霧剤		○
院外	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日 医工」	100g/本	ヘパリン類似物質噴霧剤		○
本採用	ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」	25g/本	ヘパリン類似物質クリーム	○	○
本採用	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニブ ロ」	25g/本	ヘパリン類似物質軟膏	○	○
本採用	ヘパリン類似物質ローション0.3%「NIT」	25g/本	ヘパリン類似物質液	○	○
院外	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医	50g/本	ヘパリン類似物質液		○
院外・ 院内特購	ベピオゲル2.5%	25mg/g 15g/本	過酸化ベンゾイル	(限定)	○
本採用	ヘモポリゾン軟膏	2g/本	大腸菌死菌浮遊液・ヒト [®] コロチ ゾン	○	○
院内	ベリプラストP コンビセット 組織接着用	1mL/本	生体組織接着剤	○	
院内	ベリプラストP コンビセット 組織接着用	3mL/本	生体組織接着剤	○	
院内	ベリプラストP コンビセット 組織接着用	5mL/本	生体組織接着剤	○	
院外・ 院内特購	ペンタサ坐剤1g	1g/個	メサジン	(限定)	○
院外	ペンタサ注腸1g	1g/100mL/本	メサジン		○
本採用	ペンニードルプラス	32G×4mm	-	○	○
本採用	ホーリンV腔用錠1mg	1mg	エストリオール	○	○
院外	ホクナリンテープ0.5mg	0.5mg/枚	ツロ [®] テロール		○
院外	ホクナリンテープ1mg	1mg/枚	ツロ [®] テロール		○
院外	ホクナリンテープ2mg	2mg/枚	ツロ [®] テロール		○
本採用	ボスミン外用液0.1%	1mg/mL	エピネリン	○	○
本採用	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」	30mL/本	ポ [®] ビドン [®] ヨード [®]	○	【般】
本採用	ポビドンヨードゲル10%「ケンエー」	90g/本	ポ [®] ビドン [®] ヨード [®] ゲル	○	○
本採用	ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	50mL/本	ポ [®] ビドン [®] ヨード [®]	○	○
本採用	ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	250mL/本	ポ [®] ビドン [®] ヨード [®]	○	○
本採用	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	500mL/本	ポ [®] ビドン [®] ヨード [®]	○	○
本採用	ボラザg坐剤	1個	トリ [®] バ [®] ジ [®] ト [®] リ [®] ト [®] ガイ [®] ン	○	○
院外	ポルトレンサボ12.5mg	12.5mg	ジ [®] クロ [®] フェ [®] ナ [®] ク [®] ナ [®] トリ [®] ウム		○
院外	ポルトレンサボ25mg	25mg	ジ [®] クロ [®] フェ [®] ナ [®] ク [®] ナ [®] トリ [®] ウム		○
院外	ポルトレンサボ50mg	50mg	ジ [®] クロ [®] フェ [®] ナ [®] ク [®] ナ [®] トリ [®] ウム		○
院外	ポルトレンテープ15mg	7枚/包	ジ [®] クロ [®] フェ [®] ナ [®] ク [®] ナ [®] トリ [®] ウム		○
本採用	マイクロファインプラス	32G×4mm	-	○	○
院外	マイクロファインプラス	31G×8mm	-		○
院外	マイザークリーム0.05%	5g/本	ジ [®] フル [®] プロ [®] レ [®] ト [®] ナ [®] ト		○
院外	マイザー軟膏0.05%	5g/本	ジ [®] フル [®] プロ [®] レ [®] ト [®] ナ [®] ト		○
院内	マクロゴール400	500mL/本	酸化エチレンと水との縮重合体	○	○

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	マーデュオックス軟膏	10g/本	マキカルシトル・ハタメタリオン酪酸エステル ^o 0.1 ^o 酪酸エステル		○
院外	マンジャロ皮下注2.5mg アテオス	2.5mg/0.5mL/キット	チルゼパチド		○
院外	マンジャロ皮下注5mg アテオス	5mg/0.5mL/キット	チルゼパチド		○
院外	マンジャロ皮下注7.5mg アテオス	7.5mg/0.5mL/キット	チルゼパチド		○
院外	マンジャロ皮下注10mg アテオス	10mg/0.5mL/1キット	チルゼパチド		○
院外	マンジャロ皮下注12.5mg アテオス	12.5mg/0.5mL/1キット	チルゼパチド		○
院外	マンジャロ皮下注15mg アテオス	15mg/0.5mL/1キット	チルゼパチド		○
本採用	ミオコルスプレー0.3mg	0.3mg/本1回噴霧	ニトグリセリン	○	○
本採用	ミケランL A点眼液2%	2.5mL/本	カルテロール塩酸塩	○	○
院外	ミケラン配合点眼液	2.5mL	カルテロール塩酸塩・タノプロスト		
本採用	ミドリンM点眼液0.4%	5mL/本	トピカミド ^o	○	○
院外	ミドリンP点眼液	5mL/本	トピカミド ^o ・フェニレリン塩酸塩		○
本採用	ミドレプリンP点眼液	5mL/本	トピカミド ^o ・フェニレリン塩酸塩	○	○
院外	ミルタックスパップ30mg	7枚/包	ケトプロフェン		○
院内	ミレーナ52mg	52mg/個	レボノルゲステル	○	
本採用	ムコスタ点眼液UD2%	20mg/mL 0.35mL/本	ババミビト ^o	○	○
本採用	ムコフィリン吸入液20%	2mL/包	アセチルステイナトリウム塩	○	○
本採用	無水エタノール「マルイシ」	500mL/本	エタノール	○	○
院外	メサデルムローション0.1%	1mg/g	デキサメタゾン ^o 0.1 ^o 酪酸エステル		○
院外	メサデルム軟膏0.1%	-	デキサメタゾン ^o 0.1 ^o 酪酸エステル		○
本採用	滅菌精製水	500mL/本	精製水	○	○
院外	メノエイドコンビパッチ	イストラジオール0.62mg・酢酸 ルニチステロン2.70mg	イストラジオール・酢酸ルニチステロン		○
本採用	メブチンエア-10μg 吸入100回	10μg/1回噴霧	プロピカテロール塩酸塩水和物	○	○
院外	メブチンキッドエア-5μg 吸入100回	5μg/1回噴霧	プロピカテロール塩酸塩水和物		○
院外・ 院内特購	メブチンシングヘラー-10μg 吸入100回	10μg/1回噴霧	プロピカテロール塩酸塩水和物	(限定)	○
本採用	メブチン吸入液ユニット0.3mL	30μg/0.3mL/A	プロピカテロール塩酸塩水和物	○	○
院外	モイゼルト軟膏0.3%	0.3%1g	ジファミラスト軟膏		○
院外	モイゼルト軟膏1%	1%1g	ジファミラスト軟膏		○
院外	モ-ラステープ20mg	7枚/包	ケトプロフェン		○
院外	モ-ラステープL 40mg	7枚/包	ケトプロフェン		○
院外	モ-ラスパップ30mg	7枚/包	ケトプロフェン		○
本採用	モ-ラスパップXR120mg	7枚/包	ケトプロフェン	○	○
院外	モ-ラスパップXR240mg	7枚/包	ケトプロフェン		○
院外	ユーパスタ軟膏	100g/瓶	精製白糖 ホピト ^o ニョト ^o		○
院外・ 院内特購	ユベラ軟膏	56g/本	トコフェロール・ビタミンA油	(限定)	○
院外・ 院内特購	ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	インスリンゲルテク210単位 /3mL インスリンアスパルト90単位	インスリンゲルテク インスリンアスパルト	(限定)	○
本採用	ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」	50μg/mL 2.5mL/本	ラタノプロスト	○	【般】
特購	ラパリムスゲル0.2%	2mg/g 10g/本	シロリムスゲル	(限定)	(限定)
院外	ラミシルクリーム1%	10g/本	テルビナフィン塩酸塩		○
本採用	ランタスXR注ソロスター	450単位/1.5mL/キット	インスリングルキニン	○	○
院外	ランタス注ソロスター	300単位/3mL/キット	インスリングルキニン		○
院外	リザベン点眼液0.5%	5mL/本	トラスラスト		○
院外	リズモンT g点眼液0.5%	2.5mL/本	フェニルメソリン酸塩		○
特購	リティンバ耳科用250μg セット	250μg/セット	トリアメルミン(遺伝子組換え)	(限定)	
本採用	リドカインテープ18mg「NP」	(18mg)30.5mm× 50.0mm1枚	リドカイン貼付剤	○	○
院外	リドメックスコーワクリーム0.3%	3mg/g 5g/本	プロピカテロール ^o 0.1 ^o 吉草酸エステル酢酸 エステル		○
院外	リドメックスコーワローション0.3%	3mg/g 10g/本	プロピカテロール ^o 0.1 ^o 吉草酸エステル酢酸 エステル		○
院外	リドメックスコーワ軟膏0.3%	3mg/g 5g/本	プロピカテロール ^o 0.1 ^o 吉草酸エステル酢酸 エステル		○
院外・ 院内特購	リバスタッチパッチ4.5mg	4.5mg/枚	リバスタチミン	(限定)	○
院外	リバスタッチパッチ9mg	9mg/枚	リバスタチミン		○
院外	リバスタッチパッチ13.5mg	13.5mg/枚	リバスタチミン		○
院外	リバスタッチパッチ18mg	18mg/枚	リバスタチミン		○
本採用	リボスチン点眼液0.025%	5mL/本	レボカバスタチン塩酸塩	○	○

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	リボスチン点鼻液0.025mg 112噴霧用	0.025mg	レボカバステイン塩酸塩		○
院外・院内特購	リュウアト1%眼軟膏	3.5g/本	アトピオン硫酸塩水和物	(限定)	○
院外	リレンザ	5mg/ブリストア	ザナミビル水和物		○
院外	点眼・点鼻用リンデロンA液	5mL/本	ハタメタリンリン酸エステルナトリウム・フラジモイシン硫酸塩		○
院外	リンデロン-DPクリーム	5g/本	ハタメタリンジプロピオン酸エステル		○
本採用	リンデロン-DP軟膏	5g/本	ハタメタリンジプロピオン酸エステル	○	○
院外	リンデロン-VGローション	10mL/本	ハタメタリン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩		○
本採用	リンデロン-VG軟膏0.12%	5g/本	ハタメタリン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	○	○
本採用	リンデロン-Vクリーム0.12%	5g/本	ハタメタリン吉草酸エステル	○	○
本採用	リンデロン-V軟膏0.12%	5g/本	ハタメタリン吉草酸エステル	○	○
院外・院内特購	リンデロン坐剤0.5mg	0.5mg/個		(限定)	○
院外	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	5mg/5mL/本	ハタメタリンリン酸エステルナトリウム		○
院外	ル・エストロジェル0.06%	0.06%1g 80g/本	エストラジオールゲル		○
院外	ルコナック爪外用液5%	50mg/1g	ルコナゾール		○
院外	ルミガン点眼液0.03%	0.3mg/L	ビマトプロスト		○
院外	ルムジエブ注カート	300単位/本	インスリン リスプロ		○
本採用	ルムジエブ注ミリオペン	300単位/本	インスリン リスプロ	○	○
院外・院内特購	ルムジエブ注100単位/mL	100単位/1mL 10mL/本	インスリン リスプロ	(限定)	○
本採用	ルリコンクリーム1%	10mg/g 10g/本	ルリコゾール	○	○
院外	ルリコン液1%	10mg/mL 10mL/本	ルリコゾール		○
院外・院内特購	レクタブル2mg 注腸フォーム14回	48mg・30.8g/瓶	ブデソニド注腸剤	(限定)	○
院外	レスキュラ点眼液0.12%	5mL/本	イプロメロメド		○
本採用	レスタミンコーワクリーム1%	500g/瓶	ジフェヒドラミン	○	○
院外・院内特購	レバタン坐剤0.2mg	0.2mg	ブプロピルフィン塩酸塩	(限定)	○
本採用	レベミル注 フレックスペン	300単位/3mL	インスリン デテムル	○	○
特購	レベミル注 ペンフィル	300単位/筒	インスリン デテムル	(限定)	(限定)
本採用	レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」	15mg/mL 5mL/本	レボフロキサシン水和物	○	○
本採用	レルベア100エリプタ14吸入用	1ブリストア中:ビランテロール25µg・フルチカゾンフランカルボン酸エステル100µg	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	○	○
院外	レルベア100エリプタ30吸入用	1ブリストア中:ビランテロール25µg・フルチカゾンフランカルボン酸エステル100µg	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル		○
本採用	レルベア200エリプタ14吸入用	1ブリストア中:ビランテロール25µg・フルチカゾンフランカルボン酸エステル200µg	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	○	○
院外	レルベア200エリプタ30吸入用	1ブリストア中:ビランテロール25µg・フルチカゾンフランカルボン酸エステル200µg	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル		○
本採用	ロードーズU100	30G×1/2cc	-	○	○
本採用	ロードーズU100	30G×3/10cc	-	○	○
本採用	ロキソニンゲル1%	10mg/g	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	○
院外	ロキソニンテープ50mg	50mg/枚	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○
院外	ロキソニンテープ100mg	100mg/枚	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○
院外	ロキソニンパップ100mg	7枚/包	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○
本採用	ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」	50mg/枚	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	○
院外	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」	7枚/包	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○
本採用	ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「ケミファ」	7枚/包	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	○
院外	ロコアテープ	40mg/枚	エスフルビルプロフェン・ハッカ油		○
本採用	ロコイドクリーム0.1%	5g/本	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	○	○
本採用	ロコイド軟膏0.1%	5g/本	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	○	○
特購	ロゼックスゲル0.75%	0.75%/g×50g	メトニダゾールゲル	(限定)	(限定)
本採用	ロナセンテープ20mg	20mg/枚	ブロナセリン	○	○
本採用	ワコビタル坐剤30	30mg	フェニバルビタルナトリウム	○	○